

## 前 言

田间药效试验是我国农药登记管理工作的重要内容之一,是制定农药产品标签的重要技术依据,而标签是农民安全、合理使用农药的唯一指南。为规范登记用田间药效试验方法和内容,使试验更趋科学与统一,并与国际准则接轨,使我国的药效试验报告具有国际认同性,特制定我国田间药效试验准则国家标准。该系列标准参考了欧洲及地中海植物保护组织(EPPO)田间药效试验准则及联合国粮农组织(FAO)亚太地区类似的准则,是根据我国实际情况并经过大量的田间试验验证而制定的。

在生产上许多非耕地中的杂草经常需用除草剂进行防治。为了确定防治非耕地杂草的最佳田间使用剂量,测试药剂对非靶标有益生物的影响,为非耕地除草剂登记的药效评价和安全、合理使用技术提供依据,特制定本标准。

本标准是农药田间药效试验准则(一)系列标准之一,但本身是一个独立的标准。

本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准由农业部农药检定所起草并负责解释。

本标准主要起草人:叶贵标、魏福香、贾富勤、刘学、王焕民。

# 中华人民共和国国家标准

## 农 药

### 田间药效试验准则(一)

### 除草剂防治非耕地杂草

GB/T 17980.51—2000

Pesticide—

Guidelines for the field efficacy trials (I)—

Herbicides against weeds in no-crop field

#### 1 范围

本标准规定了除草剂防治非耕地杂草田间药效小区试验的方法和基本要求。

本标准适用于除草剂防治非耕地杂草的登记用田间药效小区试验及药效评价,其中包括工业区、仓库、铁路、人行道,以及其他不希望生长杂草的地块,目的是防治所有杂草(但不包括路界、公园、运动场)。其他田间药效试验参照本标准执行。

#### 2 试验条件

##### 2.1 作物和栽培品种的选择

无。

##### 2.2 试验对象杂草的选择

试验非耕地中须具备有代表性的各种杂草种群,且分布均匀一致,杂草群落组成必须同试验的除草剂杀草谱相一致(禾草、莎草、阔叶草,一年生、多年生),记录各种杂草的中文名及拉丁学名。

##### 2.3 环境条件

所有试验小区中各种条件须均匀一致。

记录前后用过的任何种类除草剂。

#### 3 试验设计和安排

##### 3.1 药剂

###### 3.1.1 试验药剂

注明试验药剂的商品名/代号、中文名、通用名、剂型含量和生产厂家。试验药剂处理不少于三个剂量,或依据协议(试验委托方与试验承担方签订的试验协议)规定的用药量。

###### 3.1.2 对照药剂

对照药剂须为已登记注册并在实践中有较好安全性和药效的产品。对照药剂的类型和作用方式应同试验药剂相近并使用当地常用剂量和处理方法,特殊情况可视试验目的而定。设空白对照处理。

##### 3.2 小区安排

###### 3.2.1 小区排列

试验不同处理小区采用随机区组排列。防除多年生杂草的试验小区,为解决杂草分布不均匀的问题

国家质量技术监督局 2000-02-01 批准

2000-05-01 实施

可采用不规则排列,并加以说明。

### 3.2.2 小区面积和重复

小区净面积:30~50 m<sup>2</sup>。在铁路上用铁轨运载的喷雾器喷雾时,小区至少 100 m<sup>2</sup>。

重复次数:最少 4 次重复。

## 3.3 施药方法

### 3.3.1 使用方法

按协议要求及标签说明进行,常用喷雾法或撒施颗粒剂等。

### 3.3.2 使用器械

选择生产中常用的器械,用压力稳定带扇形喷头的喷雾器进行喷雾,保证使药剂均匀分布到整个小区,或使药液准确、定向落到应该受药的地方,记录所用器械类型和操作条件(操作压力、喷孔口径、喷头类型、混土深度)等全部资料。施药应保证药量准确,用药量偏差超过±10%的要记录,并记录影响药效和杂草防治持效期和选择性的因素。

### 3.3.3 施药时间和次数

按协议要求及标签说明进行。施药的时间必须符合杂草的发育特点。

a) 春季处理;

b) 初夏处理;

c) 夏季处理。

记录施药时杂草生长状态(发芽、生长阶段)。

如果标签或协议书未注明施药次数,应根据试验目的及产品有效成分的特点而定。相同产品可以一次或分次使用。记录施药次数和时间,以及杂草的生长状态(萌芽情况、生育期)。

### 3.3.4 使用剂量和用水量

依据标签说明或按协议要求的剂量和用水量进行施药。通常药剂的剂量以有效成分 g/hm<sup>2</sup>(克/公顷)表示,用水量以 L/hm<sup>2</sup>(升/公顷)表示。协议上没有说明用水量时,可根据试验药剂的作用方式、喷雾器类型,并结合当地经验确定用水量。

### 3.3.5 防治病虫和非靶标杂草所用农药的资料要求

无。

## 4 调查、记录和测量方法

### 4.1 气象及土壤资料

#### 4.1.1 气象资料

试验期间,应从试验地或最近的气象站获得降雨(降雨类型、降雨量以 mm 表示)、温度(日平均温度、最高和最低温度,以℃表示)、风力、阴晴、光照和相对湿度等资料,特别是施药当日及前后 10 天的气象资料。

整个试验期间影响试验结果的恶劣气候因素,如严重或长期干旱、大雨、冰雹等均须记录。

#### 4.1.2 土壤资料

记录土壤类型(包括成分)、土壤 pH 值、有机质含量等。

### 4.2 调查方法、时间和次数

#### 4.2.1 杂草调查

详细地描述造成杂草伤害的症状(如生长抑制、失绿、枯斑、畸形等),以准确说明药剂作用方式。

记录小区的杂草种群量,如杂草种类、杂株数、覆盖度或杂草重量等,用绝对值法或估计值法。

##### 4.2.1.1 绝对值调查法

调查每种杂草总株数或重量,对整个小区进行调查或在每个小区随机选择 3~4 个点,每点 0.25~1 m<sup>2</sup> 进行抽样调查。在某些情况下,调查杂草的器官(例如禾草分蘖数)等。

##### 4.2.1.2 估计值调查法

每个药剂处理区同邻近的空白对照区或对照带进行比较,估计相对杂草种群量。这种调查方法包括杂草群落总体和单种杂草,可用杂草数量、覆盖度、高度和长势(例如实际的杂草量)等指标。估计方法快速、简单,其结果可以用简单的百分比表示(0为无草,100%为与空白对照区杂草同等),也可等量换算成表示杂草防除百分比效果(0为无防治效果,100%为杂草全部防治)。还应记录空白对照区或对照带的杂草株数覆盖度的绝对值。为了克服准确估计百分比和使用齐次方差的困难,可以采用下列分级标准进行调查:

- 1级:无草;
- 2级:相当于空白对照区的0~2.5%;
- 3级:相当于空白对照区的2.6%~5%;
- 4级:相当于空白对照区的5.1%~10%;
- 5级:相当于空白对照区的10.1%~15%;
- 6级:相当于空白对照区的15.1%~25%;
- 7级:相当于空白对照区的25.1%~35%;
- 8级:相当于空白对照区的35.1%~67.5%;
- 9级:相当于空白对照区的67.6%~100%。

调查人员使用这种分级标准前须进行训练。本分级范围可直接应用,不需转换成估计值百分数的平均值。

#### 4.2.2 调查时间和次数

##### a) 春季和夏初处理

- 第一次调查:处理后2~4周。
- 第二次调查:处理后5~6周。
- 第三次调查:秋天,对照区杂草开始衰老前。
- 第四次调查:第二年,对照区杂草重新发芽后。

##### b) 夏季处理

- 第一次调查:处理后2~4周。
- 第二次调查:处理后5~6周对照区杂草开始衰老前夕。
- 第三次调查:在第二年对照区杂草再生后。
- 必要时进行中间调查。

#### 4.2.3 药效计算方法

药效按式(1)计算:

$$\text{防治效果(\%)} = \left( 1 - \frac{CK - PT}{CK} \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:PT——药剂处理区残存草数(或鲜重);

CK——空白对照区活草数(或鲜重)。

#### 4.3 作物调查

无。但要注意通过根部接触,除草剂被传到邻近树木或植物上的可能性。

#### 4.4 副作用观察

记录对非靶标生物的影响。

### 5 结果

用邓肯氏新复极差(DMRT)法对试验数据进行统计分析,特殊情况用相应的生物统计学方法。写出正式试验报告,并对结果加以分析说明,提出应用效果评价(产品特性、关键应用技术、适用时期和剂量、杀草谱、药效、药害)及经济效益评价的结论性意见。试验报告应列出原始数据。